

Signalé dans l'Équateur, la Colombie, le Vénézuéla, l'Amazonie et les Guyanes.

83. M. FEROX Gm., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIV, p. 253.

Mâles et femelle de Saint-Georges d'Oyapock, du Mahury et de l'Îlet de la Mère; nom vulg. : *Fontange*.

Signalé depuis Veragua, à travers toute l'Amérique du Sud, jusqu'à la République Argentine.

84. TYRANNUS MELANCHOLICUS Vieill., *Cat. Birds Brit. Mus.*, t. XIV, p. 273.

Deux mâles de l'Ouanary et du Mahury, deux femelles du Sinnamary; nom vulg. : *Quiquivi*. Régime granivore.

Cette espèce s'étend depuis le Mexique jusqu'aux environs de Buenos-Ayres, dans l'Uruguay et dans la Bolivie.

---

ANTHICIDES NOUVEAUX DES COLLECTIONS DU MUSÉUM DE PARIS,

PAR M. MAURICE PIC.

**Macratia Decorsei** nov. sp.

Robuste, modérément allongé, noir de poix avec la tête d'ordinaire roussâtre, densément revêtu d'une pubescence grisâtre longue; antennes et pattes testacées avec les tibias postérieurs rembrunis ou obscurcis. Tête longue, rétrécie derrière les yeux, avec le vertex profondément impressionné, fortement et densément ponctuée; yeux éloignés du bord postérieur de la tête. Antennes grêles et assez courtes, à 3 derniers articles plus longs et peu épaissis. Prothorax long mais robuste, peu rétréci postérieurement, plus ou moins impressionné sur le disque, et sillonné latéralement à la base, fortement et densément ponctué. Élytres assez longs, atténués au sommet, un peu plus larges que la base du prothorax, faiblement striés. Pattes robustes, testacées, avec les tibias postérieurs rembrunis ou obscurcis. Extrémité de l'abdomen et pygidium testacés.

Longueur : 6 à 8 millimètres. Madagascar, Androy, Haut Manambovo (D<sup>r</sup> J. Decorse, 1901).

Espèce remarquable par sa forme robuste jointe à la densité de sa pubescence.

FORMICOMUS FORTIPES Fairm., var. *anguliceps*.

Noir, avec les élytres verts, ces derniers assez larges, la majeure partie

basale des antennes et la base des cuisses testacées; cuisses antérieures ♂ munies d'une dent courte. Tibias simples. Tête très atténuée en arrière.

Longueur : 4 millimètres. Madagascar, Imanombo et Boeni (D<sup>r</sup> J. Decorse, 1901).

**Formicomus armipes** nov. sp. ♂.

Modérément allongé avec les élytres assez larges; brillant, noir avec les élytres verts, la base des cuisses et les antennes testacées. Tête indistinctement ponctuée, triangulairement atténuée en arrière. Antennes longues et grêles, testacées, avec les derniers articles un peu rembrunis. Prothorax plus long que large, dilaté et arrondi en avant, droit sur la base, indistinctement ponctué et subdéprimé sur le disque. Écusson triangulaire. Élytres subovales (ayant les épaules marquées), subarrondis au sommet, à pubescence grisâtre espacée et ponctuation fine. Pattes noires avec la base des cuisses testacée, cuisses antérieures larges et fortement dentées, avec les tibias arqués et dentés en dedans.

Longueur : 4 millimètres. Madagascar, Boeni (D<sup>r</sup> J. Decorse, 1901).

Voisin du précédent, mais bien distinct par la structure des pattes antérieures ♂; à placer dans le voisinage de *Schimperi* Pic.

**Formicomus Decorsei** nov. sp. ♂.

Allongé, brillant, testacé rougeâtre, avec les élytres bleus, les membres presque entièrement testacés. Tête assez longue, diminuée et subarquée en arrière, distinctement ponctuée, un peu rembrunie. Antennes longues et grêles, testacées, avec les derniers articles obscurcis. Prothorax plus long que large, modérément dilaté en avant, droit sur la base, distinctement ponctué sur le disque. Écusson triangulaire. Élytres longs, subparallèles, tronqués au sommet, à pubescence grisâtre espacée et ponctuation fine. Pattes testacées avec les cuisses rembrunies au sommet, cuisses antérieures larges et dentées avec les tibias presque droits, faiblement dentés en dedans.

Longueur : 3 millim. 5. Madagascar, Androy, Haut-Mandrare (D<sup>r</sup> J. Decorse, 1901).

Facile à reconnaître à sa forme étroite et allongée jointe à sa coloration. A placer près de *F. Alluaudi* Pic.

**Formicomus Potteri** nov. sp.

Modérément allongé, noir, avec les élytres bleuâtres, la base des antennes et une partie des pattes testacées ou rousses. Tête assez longue, triangulairement atténuée en arrière, fortement ponctuée. Antennes longues et grêles, testacées avec l'extrémité obscurcie. Prothorax plus long que large, dilaté, arrondi en avant, droit sur la base, fortement et densément ponctué,

presque opaque. Écusson peu marqué. Élytres subovales (ayant les épaules marquées), subarrondis au sommet, à longue pubescence grisâtre espacée et ponctuation assez forte. Pattes plus ou moins foncées avec la base des cuisses et les tibias antérieurs testacés ou d'un testacé roussâtre, les cuisses, et parfois les tibias postérieurs, largement obscurcis, les cuisses antérieures ♂ munies d'une dent subtronquée au sommet.

Longueur : 4 millimètres à 4 millim. 3. Abyssinie, Mission de Bonchamps (Ch. Michel et M. Potter, 1899).

Rappelle *F. Bottegoi* Pic et distinct par sa tête plus atténuée en arrière, la ponctuation subruguleuse du prothorax. A placer près de *infasciatus* Pic et voisins.

*ANTHICUS RAGAZZII* Pic, var. *Micheli*.

Coloration analogue à *bifasciatus* Rossi, c'est-à-dire avec les élytres bifasciés de roux, et ainsi distinct de *Ragazzii* Pic ayant les élytres foncés, vaguement marqués de roux antérieurement et sur le pourtour.

Longueur : 3 millim. 3. Abyssinie, Mission de Bonchamps (Ch. Michel, 1899).

*Anthicus Chevalieri* nov. sp.

Assez étroit et allongé, subdéprimé, brillant, noir de poix avec la base du prothorax et les membres testacés, les élytres fasciés de pâle. Tête courte et large, arquée en arrière, fortement ponctuée, moins sur le vertex. Antennes longues et grêles, rembrunies au sommet. Prothorax plus long que large, distinctement ponctué, fortement dilaté, arrondi en avant, sinué sur les côtés, un peu élargi à la base, celle-ci plus claire et plus densément ponctuée. Écusson triangulaire. Élytres assez allongés, subparallèles, subarrondis au sommet, assez déprimés en dessus, impressionnés en dessous des épaules, ornés d'une pubescence fine subargentée et de deux fascies flaves, avant et après le milieu, qui se réunissent sur la suture. Pattes testacées avec l'extrémité des cuisses ou des tibias un peu rembrunie, les tibias antérieurs épaissis au sommet.

Longueur : 3 millimètres. Moyen Niger (A. Chevalier, 1900).

Voisin de *A. Bellii* Pic, dont il diffère par la forme et la ponctuation de la tête, ainsi que par le dessin élytral.

*Anthicus guyanensis* nov. sp.

Robuste et assez court, presque mat, noir de poix, revêtu d'une pubescence flave, fine et assez dense, avec les premiers articles des antennes et les pattes testacés. Tête courte et grosse, presque mate, assez densément et fortement ponctuée, tronquée en arrière, impressionnée légèrement au milieu. Antennes assez courtes et grêles, un peu épaissies à l'extrémité,

obscurés avec les premiers articles plus ou moins testacés. Prothorax mat, court et large, dilaté-arrondi en avant, sinué sur les côtés, densément ponctué. Écusson assez large. Élytres courts et larges, subarrondis au sommet, fortement ponctués, un peu brillants, marqués d'une impression scutellaire. Pattes grêles et testacées.

Longueur : 2 millim. 5 à 2 millim. 8. Guyane Française : Camopi et Ouanary (F. Geay, 1900).

Sans doute voisin de *trapensis* Champ. Rappelle par sa forme *oceanicus* Laf., mais plus trapu et d'ailleurs tout autre par la coloration.

NOTA. — Les *Macatria Decorsei*, *Formicomus* v. *anguliceps* et *Potteri*, *Anthicus guyanensis* figurent aussi dans ma collection.

---

ENUMERATIO SCOLYTIDARUM E SIKKIM ET JAPAN NATARUM MUSEI HISTORICO-NATURALIS PARISIORUM, QUAS DOMINUS J. HARMAND ANNIS 1890 ET 1901 COLLEGIT DESCRIPTIONIBUS SPECIERUM NOVARUM ADJECTIS AUCTORE D<sup>r</sup> MAX HAGEDORN, HAMBURGENSEI.

HYLESINUS LATICOLLIS Blandford, *Transact. ent. soc. London*, 1894, part. 1. 1 specimen. — Patria : Yeso.

POLYGRAPHUS OBLONGUS Blandford, *l. c.*, 1 specimen. — Patria : Nippon moyen.

— PROXIMUS Bldfd, 2 specimina. — Patria : Nippon moyen.

IPS (TOMICUS) CEMBRAE Heer, *Obs. ent.*, 1836. 2 specimina. — Patria : Nippon moyen.

LEPICERUS ASPERICOLLIS Eichoff, *Ratio tomicinorum*. 33 specimina. — Patria : Dardjiling, 1879.

XYLEBORUS LEWISII Bldfd, *l. c.* 1 specimen. — Nippon moyen.

— PRAEVIUS Bldfd, *l. c.* 1 specimen. — Patria : Nippon moyen.

**Xyleborus hirtus** nov. sp., 1 specimen. — Dardjiling.

— **geminatus** nov. sp., 1 specimen. — Dardjiling.

SCOLYTOPLATYPUS TYCON Blandford, *Transact. ent. soc. London*, 1893. 3 ♂. — Nippon moyen.

— SHOGUN Bldfd, *l. c.* 1 ♀. — Nippon moyen.

— MIKADO Bldfd, *l. c.* 1 ♂, 1 ♀. — Nippon moyen.

— RAJA Bldfd, *l. c.* 1 ♂, 3 ♀. — Dardjiling.

**Scolytoplatypus pubescens** nov. sp. 5 ♀. — Dardjiling.

— **minimus** nov. sp. 1 ♀. — Dardjiling.

— **muticus** nov. sp. 1 ♂, 2 ♀. — Nippon moyen.